


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE MENOR DE
2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES
SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA
MADRE Y ANTECEDENTES DEL NIÑO.
PUESTO DE SALUD SAN JUAN,
CHIMBOTE 2010**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

TESISTA:

Bach. Enf. ZEGARRA BENAUTE, Ibette Anais

ASESORA:

Mg. PINTO FLORES, Irone Beatriz

NUEVO CHIMBOTE - PERÚ

2011

RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo Correlacional, tiene por objetivo general conocer la relación que existe entre el desarrollo Psicomotor del lactante menor de 02 años y los factores socioeconómicos y culturales de la madre; y antecedentes del niño que acude al Puesto de Salud San Juan, Chimbote 2010.

La población estuvo constituida por el 100% de las madres y los lactantes menores de 2 años, se aplicó los instrumentos: Ficha de información socioeconómica materna; Escala de Orestes Botto; Cuestionario sobre factores culturales de la madre: parte A: Costumbres y creencias y parte B: Test para medir el nivel de conocimiento de las madres acerca del desarrollo psicomotor; Antecedentes neonatales del lactante menor de 2 años; y, Test de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) al niño menor de 2 años.

El procesamiento y análisis estadístico se realizaron en el software especializado de estadística y epidemiología (EPIINFO), llegando a las siguientes conclusiones:

- El 89.8% de lactantes menores de 2 años que acudieron al Puesto de Salud San Juan presentaron un desarrollo psicomotor normal, el 8.2 % de riesgo y un 2.0% retraso.
- Algunos de los factores socioeconómicos y culturales maternos como el grado de instrucción, nivel de conocimiento guardan relación estadísticamente significativa con el desarrollo psicomotor del lactante.
- Algunos de los antecedentes neonatales del lactante menor de dos años como la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional guardan relación estadísticamente significativa con el desarrollo psicomotor del lactante.